

Tracleer (Bosentan)

Til patienter og pårørende

Bruges til patienter med forhøjet blodtryk i lungekarrene (Pulmunal hypertention).
Bruges også til at behandle og reducere sår på fingerspidser og tæer hos patienter med systemisk sclerose og eksisterende fingersårssyndrom.

Virkning

Tracleer er en tablet, som modvirker, at blodkarrene trækker sig sammen og mindsker dannelsen af arvæv.

Tracleer sænker og stabiliserer blodtrykket i lungerne. Det virker også ved at udvide de små blodkar i arme og ben. Muligvis kan Tracleer også bremse enkelte cellers evne til at danne arvæv, som er hovedproblemet ved systemisk sclerose.

Hvordan tages Tracleer?

Lægen ordinerer dosis. Tabletterne tages med et glas vand i forbindelse med et måltid.
Den ordinerede dosis ændres kun i forbindelse med lægekontrol.

Bivirkninger

Almindelige: Påvirkning af leveren, hovedpine, væskeophobning, rødme, hypotention, anæmi, sure opstød, hudkløe.

Tracleer og anden medicin

Må ikke bruges sammen med Sandimmun og medicin mod sukkersyge i form af Glibenklamid og Daonil.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning

Tracleer kan give fosterskader og må ikke bruges under graviditet. Tracleer nedsætter samtidig virkningen af p-piller, så det er nødvendigt at anvende dobbelt prævention under hele behandlingsperioden.

Kontrol

Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger af Tracleer. Kontrol af blodprøver før opstart, og derefter blodprøver efter 3 og 6 uger. Efterfølgende hver 6. uge. Ved blodprøverne kontrolleres funktionen af knoglemarv, lever og nyrer. Medicinen udleveres i Gigt og Bindevæv Ambulatorium til 2 måneder ad gangen.