

Opsætning af guldmarkør gennem mellemkødet

Til patienter og pårørende

Opsætning af guldmarkør gennem mellemkødet før strålebehandling for prostatakræft

Hvorfor skal der opsættes guldmarkør?

Når der skal gives strålebehandling for prostatakræft, er det vigtigt at skåne det omgivende væv (blæren og endetarmen) så meget som muligt.

Derfor skal det område, der bestråles, være så lille som muligt

For at være sikker på at ramme hele prostata hver gang og samtidig skåne omgivelserne, sættes der 3 guldmarkører op i prostata.

Hvis du får blodfortyndende medicin

Får du blodfortyndende medicin skal du gøre følgende afhængigt af hvilket præparat du får:

- Dipyridamol (Persantin, Orisantin) dosis fortsættes
- Acetylsalicylsyre (Magnyl, Hjerdyll, Hjertemagnyl etc) dosis fortsættes
- Warfarin (Marevan) dosis fortsættes, hvis INR er mindre end eller lig med 2,5. INR kontrolleres ved din egen læge dagen før.
- Clopidogrel (Plavix, Cloriocard, Grepid) dosis fortsættes
- Ticagrelor (Brilique) dosis fortsættes
- Rivaroxaban (Xarelto) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Apixaban (Eliquis) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Edoxaban (Lixiana) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Dabigatran (Pradaxa) pauseres i 2 dage før undersøgelsen

Hvordan foregår det?

Proceduren foregår ambulant.

Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med benene hvilende i to bøjler. Herefter desinficeres mellemkødet, og der indsprøjtes lokalbedøvelse i huden.

Guldmarkørerne sættes op gennem mellemkødet, mens der scannes med en ultralydsscanner.

Efter undersøgelsen

Der kan komme blødning fra urinrøret, blod i urinen og/eller blødning fra endetarmen. Det kan vare nogle dage, men er ikke alvorligt.

Der kan endvidere være lidt blod i eller misfarvning af sædvæsken i op til et par måneder efter, at guldmarkørerne er lagt.

Opsætning af guldmarkør gennem mellemkødet

Vær opmærksom på infektion

Der kan i sjældne tilfælde opstå infektion i urinen. Det vil vise sig ved kraftig svien, måske temperaturstigning. Andre symptomer er kulderystelser eller smerter nedadtil i maven.

Hvis du har mistanke om infektion, skal du kontakte

- Urinvejskirurgisk Ambulatorium på telefon 7918 2316 hverdage mellem kl. 8.30 -12.00. Torsdag mellem kl 9 - 12.
- Uden for dette tidsrum kontaktes Kirurgisk mellemvagt på telefon 7918 2000 - spørg efter kirurgisk mellemvagt.

Husk at gøre lægen opmærksom på, at du har fået oplagt guldmarkører i blærehalskirtlen.

Hvad skal der ske med guldmarkørerne efter behandlingen?

Guldmarkørerne bliver siddende i prostata og skal ikke fjernes, idet de ikke kan skade urinrør eller endetarm.

Hormonbehandling

Strålebehandling skal forudgås af 3 måneders hormonbehandling.

I forbindelse med oplægning af guldmarkørerne får du en hormonmanipulerende indsprøjtning enten i maveskindet eller i en muskel, hvis dette ikke allerede er givet. Herefter sendes henvisning til Onkologisk Afdeling i Vejle, som af behandlingsmæssige årsager tidligst må starte strålebehandling 12 uger senere.