

Rimactan (Римактан)

Для пациентов и их близких

Применение

Римактан применяют для лечения и профилактического лечения туберкулеза.

Для профилактического лечения туберкулеза Римактан принимают как самостоятельный антибиотический препарат.

Для полного лечения туберкулеза Римактан принимают в сочетании с другими антибиотическими препаратами.

Внимание!

Римактан нужно принимать за ½ - 1 час до еды.

Побочные действия

Римактан окрашивает мочу, кал и слезы в красно-оранжевый цвет. Контактные линзы могут изменить цвет. Возможно снижение аппетита, усталость, неприятные ощущения в животе, головная боль, головокружение, сыпь на коже.

Лекарство обычно переносится без осложнений, но следует обратиться к врачу или в амбулаторию при следующих симптомах:

- Отсутствие аппетита
- Тошнота, рвота, боли в животе
- Желтизна в глазах
- Другие побочные действия

Обратите внимание на следующее:

- Римактан снижает действие метадона.
- Принятие большого количества алкоголя не советуется при лечении Римактаном.
- Действие противозачаточных таблеток и гормональных спиралей сокращается при одновременном лечении Римактаном.
- Может возникнуть необходимость регулировки актуального антиэпилептического лечения при одновременном лечении Римактаном.
- Важно сообщить врачу, какие другие лекарства Вы принимаете, так как могут быть препараты, которые нельзя принимать вместе с Римактаном.

Вопросы

Если у Вас есть вопросы, связанные с лечением, Вы можете связаться с Пульманологической амбулаторией по телефону 7918 2671 с 8.00 до 14.30 по будним дням.

Лучше позвонить или зайти, чем самостоятельно прекращать лечение.