

Isoniazid

Til patienter og pårørende

Anvendelse

Isoniazid bruges til behandling og forebyggende behandling af tuberkulose.

Ved forebyggende behandling af tuberkulose tages Isoniazid som enkeltstående antibiotisk præparat.

Ved fuld behandling af tuberkulose tages Isoniazid i kombination med andre antibiotiske præparater.

Bemærk!

Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.

Bivirkninger

Behandling med Isoniazid kan medføre uro og krampe i ben og fødder.

Desuden kan man opleve svimmelhed, koncentrationsbesvær, hududslæt og nedsat appetit. Kvalme og opkastning kan forekomme.

Medicinen tåles sædvanligvis uden komplikationer, men kontakt læge eller ambulatorium ved følgende symptomer:

- ingen appetit
- kvalme, opkastninger, mavesmerter
- gul i øjnene
- feber
- psykiske problemer: hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, humørsvingninger
- andre bivirkninger

Vær opmærksom på

Det kan være nødvendigt at justere eventuel antiepileptisk behandling ved samtidig behandling med Isoniazid.

Isoniazid må ikke tages sammen med Antabus.

Indtagelse af større mængder alkohol frarådes ved behandling med Isoniazid.

Der kan være præparater, der ikke kan tages sammen med Isoniazid. Det er derfor vigtigt, at du oplyser lægen om, hvilken anden medicin du evt. får.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 7918 2671 kl. 8.00 - 14.30 på alle hverdage.

Det er bedre, at du ringer eller kommer forbi, end at du selv stopper behandlingen.