

Blodtrykssænkende medicin

Til patienter og pårørende

Blodtrykssænkende medicin - hvordan virker det og hvad skal du være opmærksom på

Ved skrumpelever skal man i mange tilfælde have blodtrykssænkende medicin, der kan nedsætte blodtrykket omkring din lever. Der er flere typer blodtrykssænkende medicin, og nogle af dem har navne som: Carvedilol, Propanolol.

OPSTART OG TITRERING AF BLODTRYKSSÆNKENDE BEHANDLING

Din læge og dig har besluttet, at du skal behandles med blodtrykssænkende medicin.

- Før behandlingsstart, skal du have taget en blodprøve. I blodprøven måles salte, mineraler og nyretal mhp. at sikre, at du kan tåle behandlingen. Det kan de fleste patienter.
- Du skal regne med, at du skal have målt blodtryk (og evt. blodprøve) en del gange i den periode, hvor sygeplejersken og lægen finder frem til den type medicin og dosis, som passer til dig.

Virkning

Blodtrykssænkende medicin virker på flere måder:

- Sænker puls og blodtryk
- Forebygger åreknuder i f.eks. spiserøret og mavesækken
- Behandler og forebygger væskeophobning i kroppen

Sådan tager du medicinen

- Tages med et glas vand
- Bør indtages til et måltid, da det nedsætter risikoen for blodtryksfald, når du rejser dig

Bivirkning

- Træthed, kvalme, mavesmerter, diarré, svimmelhed, kolde hænder og fødder
- Da medicinen sænker puls og blodtryk, kan der optræde lav puls og blodtryk
- Ved hårdt fysisk arbejde, kan musklerne hurtigere bliver trætte
- Søvnforstyrrelser, mareridt og depression
- I visse tilfælde kan medicinen give impotens
- Hos diabetikere kan betablokkere hæmme advarselssymptomerne på for lavt blodsukker

Hvis du oplever bivirkninger fra din medicin, er det vigtigt, at du ikke bare stopper med at tage medicinen, men at du kontakter den læge, der har ordineret medicinen eller din praktiserende læge for at aftale, hvordan du skal forholde dig.