

# Klorzoxazon

Til patienter og pårørende

## Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på.  
Du kan læse om virkning og mulige bivirkninger samt, hvordan du tager medicinen.

### Virkning

Klorzoxazon virker muskelafslappende.

### Dosering

Klorzoxazon doseres individuelt. Oftest startes med 1-2 tabletter 3-4 gange dagligt indtil bedring. Du aftaler med lægen, hvordan du skal starte behandling. CRPS-sygeplejersken hjælper dig med eventuel optrapning og indstilling af vedligeholdelsesdosis.

### Sådan tager du Klorzoxazon

Tages med et glas vand  
Kan tages med eller uden mad  
Knust tablet kan kommes på kold, blød mad

### Bivirkning

Du kan opleve bivirkninger af behandlingen. Du skal ikke forvente at få alle bivirkninger. Bivirkningerne vil ofte svinde over tid, og vi har erfaring for, at dosis skal øges mere forsigtigt, hvis du oplever bivirkninger.

Træthed  
Svimmelhed  
Fordøjelsesbesvær

Det er vigtigt, at du fortæller om de gener, du oplever. Vi ønsker at hjælpe dig godt igennem behandlingen. Det vil også være muligt at ændre behandlingen, hvis bivirkningerne er for generende.

### Kontakt

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

CPRS Center Syd

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00  
Sekretær: 7918 2275 telefontid: 8-11 & 13-14