

# Behandling af rift i endetarmsåbningen (analfissur)

Til patienter og pårørende

## Botox behandling og operation (intern lateral sfinkerektomi)

### Hvad er rift i endetarmsåbningen (analfissur)?

Læs mere om [hvad analfissur er, årsag og symptomer](#)

### Behandling

Hvis du ikke har effekt af behandlingen med Diltiazem gel, er næste trin Botox injektion mellem de to lukkemuskler ved endetarmsåbningen.

### Botoxinjektion

- Botox får ringmusklerne til at slappe af, så riften får ro til at hele. Effekten holder i ca. 3 måneder.
- Botox behandlingen kan gentages, hvis du ikke har den ønskede effekt.
- Du skal følge forberedelserne som ved en operation i fuld bedøvelse.
- Du bliver udskrevet samme dag.

### Komplikationer

Du kan opleve ufrivillig luftafgang, meget sjældent afføring. Generne forsvinder, når Botox effekten stopper.

### Operation (intern lateral sfinkertomi)

Hvis ikke Botox behandlingen virker, kan du få foretaget en operation. Operationen sker i fuld bedøvelse, hvor den indre ringmuskel delvis skæres over.

### Komplikationer

- Du kan opleve ufrivillig luftafgang og bremsestreger
- Betændelse
- Blødning

### Sådan forbereder du dig til operation

#### Faste

Du skal møde fastende på operationsdagen.

Læs mere om [Fasteregler](#)

#### Bad før operation

Læs mere om [Badning før operation](#)

#### Bedøvelse

Læs mere om

[Før du skal bedøves](#)

# Behandling af rift i endetarmsåbningen (analfissur)

## Udtømning

Det er vigtigt, at din tarm er tømt inden operationen.

- 2 timer inden operationen, skal du bruge den medsendte Klyx 120 ml.
- Du fører tubens spids op i endetarmen og tømmer den.
- Pas på ikke at slippe presset om tuben, da væsken så suges ud igen, når du trækker tuben ud.
- Har du brug for hjælp, hjælper vi gerne ved indlæggelsen.

## Rygning

For at fremme sårhelingen og minimere risiko for komplikationer anbefaler vi, at du stopper med at ryge 6 uger før din operation og vedholder rygestoppet efter operationen.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. rygning: [Rygning og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres](#)

Find [rygestoptilbud](#) i din kommune

## Alkohol

Hvis du normalt drikker mere end 4 genstande om dagen, råder vi dig til at stoppe helt med at drikke alkohol mindst 4 uger før din operation.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger: [Alkohol og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres](#)

## Medicin

Hvad gør du med den medicin du får hjemmefra? Læs mere om [Medicin](#)

- Hvis du får blodfortyndende medicin eller naturmedicin, skal vi vide det!
- Hvis du får blodfortyndende medicin kan det være nødvendigt at holde en pause. Ved forundersøgelsen vil vi tage stilling til, om du skal holde pause.
- Tager du kosttilskud og/eller naturlægemidler, skal du holde pause i 7 dage.

## Hvordan forholder jeg mig efter operationen?

### Smertestillende medicin

Efter en operation kan du ofte have behov for smertestillende medicin. Vi anbefaler, at du sørger for at købe håndkøbsmedicin som fx Pinex, Panodil eller Pamol til når du udskrives. Husk at læse indlægssedlen.

Nogle patienter har brug for stærkere medicin - hvis det er tilfældet, vil du få dette udleveret efter operationen.

### Hvad skal du være opmærksom på efter operationen?

Du bør undgå at presse, når du skal på toilet. Især de første uger efter operationen.

Det er vigtigt, at du har gang i maven (blød afføring) for at undgå smerter og ubehag, når du skal på toilettet.

Det kan være nødvendigt at tage afføringsmiddel i en periode. Husk at drikke min. 2L væske dagligt.

# Behandling af rift i endetarmsåbningen (analfissur)

## **Når du udskrives**

Ved udskrivelsen fortæller vi dig, hvordan du skal forholde dig lige efter udskrivelsen m.h.t. såret, smertebehandling, sygemelding, mavetarm funktion, motion, kost og væske.

- Du må genoptage vanlig fysisk aktivitet straks efter udskrivelsen.
- Du får en tid til telefonkonsultation 6-8 uger efter operationen.

Spørg, hvis du er i tvivl

Med venlig hilsen

Mave og Tarm Ambulatorium

Sydvestjysk Sygehus