

# Vævsprøver fra prostata gennem mellemkødet

Til patienter og pårørende

## Transperineal prostatabiopsi

Du er henvist til vævsprøvetagning af prostata (blærehalskirtlen) gennem mellemkødet (huden mellem pungen og endetarmen), på mistanke om kræft i prostata. Vævsprøverne sendes til mikroskopisk undersøgelse.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, om det drejer sig om kræft, men vævsprøverne vil give os mulighed for at afklare dette.

### Før undersøgelsen

Får du blodfortyndende medicin skal du gøre følgende afhængigt af hvilket præparat du får:

- Dipyridamol (Persantin, Orisantin) dosis fortsættes
- Acetylsalicylsyre (Magnyl, Hjerdyl, Hjertemagnyl etc) dosis fortsættes
- Warfarin (Marevan) dosis fortsættes.

INR måles på sygehuset 2 timer før undersøgelsen.

- Clopidogrel (Plavix, Cloriocard, Grepid) dosis fortsættes
- Ticagrelor (Brilique) dosis fortsættes
- Rivaroxaban (Xarelto) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Apixaban (Eliquis) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Edoxaban (Lixiana) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.
- Dabigatran (Pradaxa) pauseres i 2 dage før undersøgelsen.

**Vi opfordre dig til at have spist forud for prøvetagningen i ambulatoriet, for at undgå du bliver utilpas.**

### Undersøgelsen

Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med benene hvilende i to bøjler. Lægen starter undersøgelsen med at mærke på prostata i endetarmen. Herefter desinficeres mellemkødet, og der indsprøjtes lokalbedøvelse i huden.

En ultralydsskanner, lidt tykkere end en tommelfinger, indføres et par cm i endetarmen, hvorefter prostata bedøves med yderligere en indsprøjtning.

Lægen tager typisk mellem 4 og 12 prøver fra prostata. Du hører et lille klik ved hver prøvetagning, dette gør normalvis ikke ondt.

Nogle patienter har glæde af at lytte til musik under undersøgelsen. Du er derfor velkommen til at

# Vævsprøver fra prostata gennem mellemkødet

medbringe afspiller/telefon og høretelefoner.

## **Efter undersøgelsen**

Der kan komme blødning fra urinrøret, blod i urinen og/eller blødning fra endetarmen. Dette kan vare i op til en uge, men er ikke alvorligt. Samtidig kan der være blod i eller misfarvning af sædvæsken i op til et par måneder efter, at prøverne er taget.

## **Vær opmærksom på infektion**

Der kan i sjældne tilfælde opstå infektion i urinen. Det vil vise sig ved kraftig svien ved vandladning og måske temperaturstigning. Andre symptomer er kulderystelser eller smerter nedadtil i maven.

## **Hvis du har mistanke om infektion, skal du kontakte**

- Urinvejskirurgisk Ambulatorium på telefon 7918 2316 hverdage mellem kl. 8.30 -12.00. Torsdag mellem kl 9 - 12.
- Uden for dette tidsrum kontaktes kirurgisk mellemvagt på Sygehusets hovednummer telefon 7918 2000 - spørg efter kirurgisk mellemvagt.

Husk at gøre lægen opmærksom på, at du har fået taget en prøve fra blærehalskirtlen.

## **Prøvesvar**

Det tager cirka 7 dage, før vi har svar på prøverne.

Vi aftaler derfor allerede på undersøgelsesdagen en tid til svarsamtale med en læge.

Vi anbefaler, at have en pårørende med til samtalen.