

# Behandling med Leukeran

Til patienter og pårørende

Leukeran findes som

- tablet á 2 mg

Tabletterne er overtrukket med en tynd film, så man ved berøring ikke kommer i direkte kontakt med det aktive stof.

Tabletterne må derfor ikke deles eller knuses.

## Hvordan virker medicinen?

Leukeran er en form for kemoterapi.

Leukeran indvirker direkte på cellernes, specielt kræftcellernes, evne til at dele sig. Det bevirker, at mængden af kræftceller bliver mindre.

## Dosering

Behandlingen med Leukeran er individuel.

Leukeran gives som en daglig behandling med en eller flere tabletter.

## Hvordan indtages medicinen?

Tabletterne indtages på én gang, og bør tages på tom mave (mindst en time før eller tre timer efter et måltid).

## De mest almindelige bivirkninger

Der kan ses en påvirkning af knoglemarvens celler med nedsat antal blodplader, røde og hvide blodlegemer.

Dette kan i sjældne tilfælde give anledning til blødning: næseblod, blødning fra tandkødet eller blod i urinen (nedsat blodpladetal) eller øget infektionstendens i form af feber, øvre luftvejsinfektioner og blærebetændelser (nedsat hvide blodlegemer).

Blodmangel kan forekomme. Det kan give øget træthed, svimmelhed, øresusen og stakåndethed (nedsat røde blodlegemer).

I sjældne tilfælde kan der ses påvirkning af lever og lunger.

## Specielle forholdsregler

Hvis der under behandlingen med Leukeran opstår feber (over 38 grader) eller øget blødningstendens, skal du umiddelbart kontakte din læge eller vagtlæge. Der vil så blive taget stilling til afbrydelse af Leukeranbehandlingen, påbegyndelse af antibiotikabehandling og eventuelt indlæggelse.

Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller Leukeranbehandlingen er du altid velkommen til at kontakte en læge eller sygeplejerske fra afdelingen.