

Kikkertundersøgelse børn (koloskopi)

Til patienter og pårørende

Du har fået tid til kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi)

Udtømning med Citrafleet.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Kikkertundersøgelsen udføres med en bøjelig kikkert (på tykkelse med en finger).

Kikkerten indføres via endetarmen og hele tyktarmen undersøges.

Børn undersøges i fuld bedøvelse. Det er muligt at tage vævsprøver fra tarmslimhinden.

Undersøgelsen varer ca. 30 minutter.

Medbring læsestof og evt. musik, da der kan være ventetid.

Forberedelse til undersøgelsen

Udtømning til koloskopi med Citrafleet.

Du skal følge denne vejledning og ikke indlægssedlen fra æsken.

Udtømningen medfører diarré (virker som regel inden for 1-3 timer).

Udtømningen kan medføre kvalme og hovedpine.

Tre dage før undersøgelsen

Spis, hvad du plejer. Men undgå groft brød og frugt med kerner.

Drik rigeligt.

Dagen før undersøgelsen

Du må ikke få fast føde denne dag, bortset fra et let morgenmåltid, og derefter kun flydende kost.

Du må få:

- Klar suppe uden fyld
- Saftevand
- Juice (uden frugtkød)
- Sodavand
- Vand
- Mælk/kærnemælk
- Yoghurt uden frugtstykker
- Is

Det er vigtigt at drikke rigeligt hele dagen, gerne sukkerholdig væske (ikke light eller sukkerfri).

Dette gælder også patienter med sukkersyge.

Kl. 14.00

Tag et glas med koldt vand.

- til 1/2 brev bruges 1/2 glas vand

Kikkertundersøgelse børn (koloskopi)

- til 1 brev bruges 1 glas vand

Hæld den beskrevne mængde Citrafleet i vandet

- Børn 1-2 år: 1/4 brev Citrafleet
- Børn 2-4 år: 1/2 brev Citrafleet
- Børn 4-9 år: 1 brev Citrafleet
- Børn > 9 år: 1 brev Citrafleet

Rør i blandingen i 2-3 minutter. Når det ikke længere bruser, er blandingen færdig. Blandingens vil være uklar/råhvid. Drik blandingen, helst indenfor 15 minutter.

Det er vigtigt at drikke rigeligt:

- efter 1/4 brev drikkes mindst 1/4 liter væske
- efter 1/2 brev drikkes mindst 1/2 liter væske
- efter 1 brev drikkes mindst 1 liter væske i løbet af et par timer

Kl. 19.00

Tag et glas med koldt vand.

til 1/2 brev bruges 1/2 glas vand

til 1 brev bruges 1 glas vand

Hæld den beskrevne mængde Citrafleet i vandet.

- Børn 1-2 år: 1/4 brev Citrafleet
- Børn 2-4 år: 1/2 brev Citrafleet
- Børn 4-9 år: 1/2 brev Citrafleet
- Børn > 9 år: 1 brev Citrafleet

Rør i blandingen i 2-3 minutter. Når det ikke længere bruser, er blandingen færdig. Blandingens vil være uklar/råhvid. Drik blandingen, helst indenfor 15 minutter.

Det er vigtigt at drikke rigeligt:

- efter 1/4 brev drikkes mindst 1/4 liter væske
- efter 1/2 brev drikkes mindst 1/2 liter væske
- efter 1 brev drikkes mindst 1 liter væske i løbet af et par timer

På undersøgelsesdagen

Må du drikke tynde væsker indtil 2 timer før mødetid.

Komplikationer

Komplikationer er sjældne.

Bliver der fjernet polypper, er der en lille risiko for, at der kan gå hul på tarmen (0,5 %).

Efter undersøgelsen kan du få lidt mavesmerter og lidt blødning.

Efter undersøgelsen

Får du tilbudt mad og drikke.

Inden udskrivelsen (1/2 -1 time efter undersøgelsen) får du mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen.

Kikkertundersøgelse børn (koloskopi)

Hjemtransport

Du skal selv sørge for hjemtransport.

Hjemme igen

Hvis du indenfor 24 timer får kraftige smerter, blødning eller feber, skal du ringe på telefon 7918 2000 med henblik på kontakt til Mave-tarm kirurgisk vagthavende.

Efter 24 timer skal du kontakte egen læge eller vagtlæge ved problemer.